

امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2008

الشعبة : تقني رياضي

المدة : 04 ساعات و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

تمرين 1: (4 نقاط)

لتكن في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة (\*) المعرفة كما يلي:

$$Z^3 + (2-4i)Z^2 - (6+9i)Z + 9(-1+i) = 0 \quad \dots (*)$$

1/ بيّن أن  $Z_0 = 3i$  هو حل للمعادلة (\*)

2/ حل، في  $\mathbb{C}$ ، المعادلة (\*) ثم أكتب حلولها  $Z_0, Z_1, Z_2$  على الشكل الأسّي حيث  $|Z_1| < |Z_2|$ .

3/ لتكن  $A, B, C$  صور الحلول  $Z_0, Z_1, Z_2$  على الترتيب في مستو منسوب إلى معلم متعامد

ومتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . عيّن النقطة  $G$  مرجح الجملة  $\{(A,1); (B,1); (C,-1)\}$ .

4/ عيّن المجموعة  $(E)$  للنقطة  $M$  حيث:  $AM^2 + BM^2 - CM^2 = -13$

بيّن أن النقطة  $A$  تنتمي إلى المجموعة  $(E)$  ثم أنشئ  $(E)$ .

5/ تحقق أن النقطة  $O, B$  و  $G$  في استقامة ثم عيّن صورة المجموعة  $(E)$  بالتحاكي الذي مركزه

النقطة  $O$  ويحول  $B$  إلى  $G$  محددًا عناصره المميزة.

تمرين 2: (5 نقاط)

نعتبر الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$A(1,2,2), B(3,2,1), C(1,3,3)$  نقط من هذا الفضاء.

1/ برهن أن النقط  $A, B, C$  تعين مستو يطلب تعيين معادلته الديكارتية.

2/ نعتبر المستويين  $(P_1)$  و  $(P_2)$  المعرفين بمعادلتيهما الديكارتيتين:

$$(P_1): x - 2y + 2z - 1 = 0$$

$$(P_2): x - 3y + 2z + 2 = 0$$

بيّن أن  $(P_1)$  و  $(P_2)$  يتقاطعان وفق مستقيم  $(\Delta)$ .

3/ بيّن أن النقطة  $C$  تنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

4/ بيّن أن الشعاع  $\vec{u}(2,0,-1)$  هو أحد أشعة توجيه المستقيم  $(\Delta)$ .

5/ استنتج أن التمثيل الوسيط للمستقيم  $(\Delta)$  هو الجملة:

$$\begin{cases} x = 2k + 1 \\ y = 3 \\ z = -k + 3 \end{cases}$$

حيث  $(k \in \mathbb{R})$

6/ لتكن  $M$  نقطة من المستقيم  $(\Delta)$  ، أوجد قيمة الوسيط  $k$  حتى يكون الشعاعان  $\overline{AM}$  و  $\overline{u}$  متعامدين، ثم استنتج المسافة بين النقطة  $A$  والمستقيم  $(\Delta)$ .

**تمرين 3: (7 نقاط)**

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على المجال  $[0;2]$  بالعلاقة

$$f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$$

1/ أ- ادرس تغيرات الدالة  $f$  على المجال  $[0;2]$

ب- أنشئ  $(C)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
(الوحدة على المحورين  $4cm$ )

ج- برهن أنه إذا كان  $x \in [0;2]$  فإن  $f(x) \in [0;2]$ .

2/ نعرف المتتالية العددية  $(U_n)$  على  $\mathbb{N}$  كالآتي:

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

أ- برز وجود المتتالية  $(U_n)$ . احسب الحدين  $U_1$  و  $U_2$   
ب- مثل الحدود  $U_0$  ،  $U_1$  و  $U_2$  على محور الفواصل وذلك بالاستعانة بالمنحنى  $(C)$  والمستقيم  $(D)$  ذو المعادلة  $y = x$ .

ج- ضع تخميناً حول اتجاه تغير  $(U_n)$  و تقاربها انطلاقاً من التمثيل السابق.

3/ أ- برهن بالتراجع على العدد الطبيعي  $n$  أن:  $0 \leq U_n \leq \sqrt{3}$ .

ب- برهن أنه مهما يكن العدد الطبيعي  $n$  فإن:  $U_{n+1} > U_n$ .  
ماذا تستنتج بالنسبة إلى تقارب  $(U_n)$  ؟

ج- تحقق أن:  $U_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{2-\sqrt{3}}{U_n+2} (U_n - \sqrt{3})$  من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم.

عین عدداً حقيقياً  $k$  من  $]0;1[$  بحيث:  $|U_{n+1} - \sqrt{3}| \leq k|U_n - \sqrt{3}|$

بين أنه من أجل  $n \in \mathbb{N}^*$ :  $|U_n - \sqrt{3}| \leq k^n |U_0 - \sqrt{3}|$ . استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

**تمرين 4: (4 نقاط)**

$n$  عدد طبيعي أكبر من 5.

1/  $a$  و  $b$  عددان طبيعيان حيث  $a = n - 2$  و  $b = 2n + 3$

أ- ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$  ؟

ب- بين أن العددين  $a$  و  $b$  من مضاعفات 7 إذا وقط إذا كان  $n + 5$  مضاعفاً للعدد 7.

ج- عین قيم  $n$  التي يكون من أجلها  $PGCD(a; b) = 7$

2/ نعتبر العددين الطبيعيين  $p$  و  $q$  حيث:

$$q = n^2 - 7n + 10 \quad \text{و} \quad p = 2n^2 - 7n - 15$$

أ- بين أن كل من العددين  $p$  و  $q$  يقبل القسمة على  $n - 5$ .


ب- عین تبعا لقيم  $n$  وبدلالة  $n$  ،  $PGCD(p; q)$ .

التمرين الأول: ( 04 نقاط )

- نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين  $x$  و  $y$  : (I) .....  $4x - 9y = 319$
- (1) - تأكد أن الثنائية  $(1, 82)$  حل للمعادلة (I).  
- حل المعادلة (I).
- (2) عين الثنائيات  $(a, b)$  الصحيحة، حلول المعادلة : (II) .....  $4a^2 - 9b^2 = 319$
- (3) استنتج الثنائيات  $(x_0, y_0)$  حلول المعادلة (I) بحيث  $x_0$  و  $y_0$  مربعين تامين.

التمرين الثاني : ( 04 نقاط )

$ABCDEF$  موشور قائم قاعدته المثلث  $ABC$  القائم في  $A$  والتمساوي الساقين وجهاه  $ABED$  و  $ACFD$  مربعان متقايسان طول ضلع كل منهما  $r$  حيث  $r \in \mathbb{R}^+$ .  
(انظر الشكل)



- (1) يرمز  $I$  إلى منتصف  $[AD]$  و  $J$  إلى مركز ثقل الرباعي  $BCFE$ . بين أن  $G$  مرجح الجملة  $\{(A;2), (B;1), (C;1), (D;2), (E;1), (F;1)\}$  هو منتصف  $[IJ]$
- (2) ينسب الفضاء إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(A; \overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD})$ .
- عين إحداثيات النقط  $F, E, D, C, B, A$   
- عين مجموعة النقط  $M$  من الفضاء التي تحقق :  
 $2MA^2 + MB^2 + MC^2 + 2MD^2 + ME^2 + MF^2 = 10r^2$

التمرين الثالث : ( 04 نقاط )

$r$  عدد حقيقي موجب تماما و  $\theta$  عدد حقيقي كفي.

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  :

$$z^2 - 2i \left( r \cos \frac{\theta}{2} \right) z - r^2 = 0$$

اكتب الحلين على الشكل الآسي.

- (2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  نعتبر النقطتين  $A$  و  $B$  صورتَي الحلين.  
عين  $\theta$  حتى يكون المثلث  $OAB$  متقايس الأضلاع.

التمرين الرابع: ( 08 نقاط )

1 (  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $]-2; +\infty[$  كما يأتي:  $f(x) = \frac{x^2 + 5}{x + 2}$  .

$C_r$  منحنى  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \bar{i}, \bar{j})$ .  
( وحدة الأطوال  $2cm$  )

أ - احسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف .

ب - ادرس اتجاه تغير  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

ج - بين أن المستقيم  $(D)$  الذي معادلته  $y = x - 2$  مقارب للمنحنى  $C_r$  ثم ارسم  $C_r$  و  $(D)$ .

د - بين أن صورة المجال  $\left[1; \frac{5}{2}\right]$  محتواة في المجال  $\left[1; \frac{5}{2}\right]$

2 ( نعتبر المتتالية العددية  $(U_n)$  المعرفة بحدّها الأول  $U_0 = 1$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$

لدينا:  $U_{n+1} = f(U_n)$  .

أ - باستخدام  $C_r$  و المستقيم ذي المعادلة  $y = x$ ، مثل  $U_0$  و  $U_1$  و  $U_2$  على حامل محور الفواصل  $(Ox)$  .

ب - خمن اتجاه تغير وتقارب المتتالية  $(U_n)$  .

ج - بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن:  $1 \leq U_n \leq \frac{5}{2}$  و أن المتتالية  $(U_n)$  متزايدة .

د - استنتج أن  $(U_n)$  متقاربة و احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  .

تكتب الإجابة النموذجية على هذه الورقة و لا تقبل سواها

الإجابة النموذجية لموضوع لامتحان :يكالوريا دورة:2008  
 اختبار مادة: الرياضيات الشعبة: تقني رياضي المدة: 04 ساعات و 30 د .

# الإجابة النموذجية وسلم التقييط

الموضوع الأول

العلامة		عناصر الإجابة	عنوان الموضوع
المجموع	مجزأة		
04	0.5	تمرين 1: (4 نقاط) 1/ بالتعويض في المعادلة (*) نبيّن أن $Z_0 = 3i$ هو حل لها 2/ حلول (*) في $\mathbb{C}$ هي :	المركبة يلات نقطية
	0.25	$(Z - 3i)[Z^2 + (2 - i)Z - 3 - 3i] = 0$	
	0.25x4	$Z_2 = -3$ ، $Z_1 = 1 + i$ ، $Z_0 = 3i$ ، $\Delta = 15 + 8i = (4 + i)^2$	
	0.25x3	الشكل الأسّي $Z_2 = 3e^{i\pi}$ ، $Z_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ ، $Z_0 = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$	
	0.25	3/ تعيين النقطة $G$ : $G(4, 4)$	
	0.5	4/ المجموعة $(E)$ هي الدائرة ذات المركز $G$ ونصف القطر $\sqrt{17}$	
	0.25	$A$ نقطة من هذه الدائرة لأن $GA = \sqrt{17}$	
	0.25	5/ العبارة المركبة للتحاكي المطلوب هي : $z' = 4z$	
0.25	صورة المجموعة $(E)$ بهذا التحاكي هي الدائرة ذات المركز $G'(16; 16)$ ونصف القطر $4\sqrt{17}$		
	0.5	تمرين 2: (5 نقاط) 1/ نلاحظ أن $\overline{AB}(2, 0, -1)$ و $\overline{AC}(0, 1, 1)$ مستقلان خطيا	
	0.5	منه النقط $A, B, C$ تعين مستو معادلته هي $x - 2y + 2z - 1 = 0$	
	0.5	2/ $(P_1)$ و $(P_2)$ متقاطعان وفق مستقيم $(\Delta)$ لأن الشعاعين الناظرين عليهما $\vec{n}_1$ و $\vec{n}_2$ غير متوازيين حيث $\vec{n}_1(1, -2, 2)$ و $\vec{n}_2(1, -3, 2)$	
	0.5	3/ $C$ تنتمي إلى المستقيم $(\Delta)$ لأنها نقطة مشتركة بين $(P_1)$ و $(P_2)$	
	0.5		



العلامة		مجاورة	عناصر الإجابة	مجاورة الموضوع
المجموع	مجاورة			
07	0.25		بما أننا برهنا أن $(U_n)$ محدودة من الأعلى بالعدد $\sqrt{3}$ ومتزايدة تماما نستنتج أنها متقاربة وهذا ما يؤكد صحة المخمئة السابقة	
	0.25		ج - التحقق أن $U_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{2-\sqrt{3}}{U_n+2}(U_n - \sqrt{3})$	
	0.25		تعيين عددا حقيقيا $k$ يجيب عن السؤال	
	0.25		تبيان أن: $ U_n - \sqrt{3}  \leq k^n  U_0 - \sqrt{3} $	
	0.25		من المتباينة السابقة نستنتج أن $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \sqrt{3}$	
04	0.75		<b>تمرين 4: (4 نقاط)</b> 1/ أ - القيم الممكنة للعدد $\text{pgcd}(a,b)$ هي 1 أو 7	التواسم المضاعفات
	0.75		ب - نعلم على المساواة $b - a = n + 5$ لكي نبرهن أن العددين $a$ و $b$ من مضاعفات 7 إذا فقط إذا كان $n + 5$ مضاعفا للعدد 7	
	0.25x2+0.25		ج - تعيين قيم $n$ التي يكون من أجلها $\text{PGCD}(a;b) = 7$ بناء على جواب السؤال السابق فإن قيم $n$ التي يكون من أجلها $\text{PGCD}(a;b) = 7$ هي نفسها قيم $n$ التي يكون من أجلها $n + 5$ مضاعفا للعدد 7 أي $n + 5 \equiv 0[7]$ ومنه $n = 7k - 5$ مع $k > 1$ .	
	0.25x2		2/ أ - العددان $p$ و $q$ يقبلان القسمة على $n - 5$ لأن $q = (n - 5)(n - 2)$ و $p = (n - 5)(2n + 3)$	
	0.25		ب - تعيين تبعا لقيم $n$ وبدلالة $n$ $\text{PGCD}(p;q)$ : لدينا $\text{PGCD}(p;q) = (n - 5)\text{PGCD}(a;b)$ نميز حالتين هما: 1 - لما $\text{PGCD}(a;b) = 7$ نجد: $\text{PGCD}(p;q) = 7(n - 5)$ مع $n = 7k - 5$ أي $\text{PGCD}(p;q) = 7(7k - 10)$ و $k > 1$	
0.5		2 - لما $\text{PGCD}(a;b) \neq 7$ أي $\text{PGCD}(a;b) = 1$ نجد: $\text{PGCD}(p;q) = (n - 5)$ مع $n \neq 7k - 5$ .		
			انتهى	

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
المجموع	مجزأة		
1.25	0.25	التمرين الأول : 04 ن 1) التأكد من أن (82,1) حل للمعادلة (I) ..... حلول المعادلة (I) هي : $(x=9k+82, y=4k+1)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ .....	القواسم و المضاعفات
1.75	0.75	2) $(2a-3b)(2a+3b)=11 \times 29$ ..... $S = \{(-80, -53); (-80, 53); (-10, -3); (-10, 3); (80, -53); (80, 53); (10, 3); (10, -3)\}$ .....	
1	1	3) الاستنتاج : $S' = \{(100, 9); (6400, 2809)\}$ .....	
1	1	التمرين الثاني : 04 ن 1) تبيان أن G منتصف [IJ] .....	هندسة فضائية
3	6×0.25	2) $F(0, r, r); E(r, 0, r); D(0, 0, r); C(0, r, 0); B(r, 0, 0); A(0, 0, 0)$ .....	
	3×0.5	مجموعة النقط M هي سطح الكرة الذي مركزها $G\left(\frac{r}{4}, \frac{r}{4}, \frac{r}{2}\right)$ ونصف قطرها $\frac{r}{4}\sqrt{10}$ .....	
2.5	0.5×3	التمرين الثالث : 04 ن 1) $\Delta' = r^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ، $z_1 = r \sin \frac{\theta}{2} + ir \cos \frac{\theta}{2}$ و $z_2 = -r \sin \frac{\theta}{2} + ir \cos \frac{\theta}{2}$ .....	الأعداد المركبة والهندسة
	0.5×2	الشكل الأسّي : $z_1 = r e^{i\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)}$ و $z_2 = r e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right)}$ .....	
1.5	0.5×2	2) المثلث متقايس الأضلاع : $\widehat{AOB} = \frac{\pi}{3}$ و $OA = OB$ .....	
	0.25×2	$k \in \mathbb{Z} \mid \theta = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k ; \theta = \frac{\pi}{3} + 2\pi k$ .....	
	0.25×2	التمرين الرابع : 08 ن 1) أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$ .....	الدوال العددية
	0.5×2	ب - $f'(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{(x+2)^2}$ و إشارته .....	
	0.5	- جدول التغيرات .....	
	1	ج - $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-2)) = 0$ و (D) مقارب مائل .....	
	1	رسم $C_f$ .....	
4.75	0.75	د - تبيان أن صورة المجال $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ محتواة في $\left[1; \frac{5}{2}\right]$ .....	
	1	2) أ - تمثيل الحدود $U_0$ و $U_1$ و $U_2$ .....	
	0.75	ب - تخمين اتجاه تغير وتقارب $(U_n)$ .....	
	0.5×2	ج - تبيان أن $1 \leq U_n \leq \frac{5}{2}$ و $(U_n)$ متزايدة .....	
	0.25	د - $(U_n)$ متقاربة .....	
3.25	0.25	$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{5}{2}$ .....	